


# WARNING!

## \*Black Tar Heroin May Cause Botulism\*

Injecting heroin, especially black tar heroin, can cause **WOUND BOTULISM**. **WOUND BOTULISM** is a serious disease caused by bacteria that can be found in heroin. These bacteria produce a toxin that causes paralysis.

### LOOK FOR SYMPTOMS!

Symptoms can start several days to weeks after injecting drugs. You may or may not notice a wound. Botulism can make you weaker until you cannot breathe. It can kill you. **BUT** it can be treated if it is caught early.



### UNDERSTAND YOUR RISK!

**MUSCLING** and **SKIN POPPING** put you at highest risk. But injecting into a vein is risky too.

There is **NO WAY TO KNOW** if bacteria are in the heroin. **Cooking the drug DOES NOT KILL THE BACTERIA.**

If you have any of the symptoms, go to the nearest **EMERGENCY ROOM** immediately. Take this flyer to be seen quickly.

If you want or need treatment for a drug problem, call 1-800-662-HELP (4357)


# ADVERTENCIA DE BOTULISMO

## La heroína de color negro podría estar contaminada

Inyectarse heroína de color negro puede causar **BOTULISMO POR HERIDA**, una enfermedad grave causada por una bacteria que se puede encontrar en la heroína. Esta bacteria produce una toxina que causa parálisis.

### BUSCAR SÍNTOMAS

Los síntomas pueden comenzar de varios días hasta semanas después de inyectarse drogas. Puede notar o no una herida. El botulismo puede debilitarlo hasta que no pueda respirar. Puede matarlo. Pero se puede tratar si se detecta a tiempo.



### ENTENDER SU RIESGO

- Las inyecciones intramusculares y subcutáneas lo ponen en mayor riesgo pero inyectarse en una vena también es riesgoso.
- **NO HAY FORMA DE SABER** si hay bacterias en la heroína.
- Cocinar la droga **NO MATA LA BACTERIA**.

Si tiene alguno de los síntomas, vaya inmediatamente a la **SALA DE EMERGENCIA** más cercana. Lleve este folleto para ser visto rápidamente.