

¿Cuál es la diferencia entre una Dosis de Refuerzo y una Dosis Adicional?

Las vacunas son la mejor protección contra una enfermedad grave, hospitalización y muerte causada por COVID-19. La mayoría de las personas que están completamente vacunadas continúan protegidas.

Algunas personas son elegibles para recibir una dosis de refuerzo o una dosis adicional.

Dosis de Refuerzo

Dependiendo en la respuesta del inmune la primera vacunación podría haber disminuido con el tiempo.

¿Quién es elegible?

Personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson:

Personas de 18 años o más DEBEN recibir una dosis de refuerzo

Personas que hayan completado la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna:

Personas que DEBEN recibir una dosis de refuerzo:

Edades de 65 años o más

Edades de 50–64 años con condiciones médicas

Residentes de 18 años o más en instalaciones de atención a largo plazo



Personas que PUEDEN recibir una dosis de refuerzo:

Edades de 18 a 49 años con condiciones médicas

Edades de 18 años y más con mayor riesgo de COVID-19 debido al entorno laboral o institucional, como:

- Personal de primeros auxilios (trabajadores de la salud, bomberos, policía, personal de atención colectiva)
- Personal educativo (maestros, personal de apoyo, trabajadores de guarderías)
- Alimentos / Agricultura
- Tránsito público
- Personal de la cárcel
- Tiendas de alimentos
- Fabricación
- Servicio Postal

¿Cuándo se puede administrar?

6 meses después de recibir la serie de dos dosis de **Pfizer o Moderna**

2 meses después de recibir la vacuna **Johnson & Johnson**

Las personas elegibles pueden elegir qué vacuna recibir para la dosis de refuerzo. Llame a su médico o farmacia local para verificar la disponibilidad de su vacuna preferida.

¿Cuál es la diferencia entre una Dosis de Refuerzo y una Dosis Adicional?

Dosis Adicional

Se administra a personas con sistemas inmunitarios debilitados que no han respondido completamente a las primeras dosis.

¿Quién es elegible?

Personas que hayan completado la **serie de dos dosis de Pfizer o Moderna** Y tengan un **sistema inmunológico moderadamente o gravemente comprometido**.

La vacuna Johnson & Johnson aún no está aprobada como dosis adicional.

Las condiciones y tratamientos incluyen:

- Tratamiento activo del cáncer para tumores o cánceres de la sangre
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave
- Trasplante de órganos sólidos y está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- Trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
- Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas

¿Cuándo se puede administrar?

28 días después de recibir la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna

Hable con su médico para ver si recibir una dosis adicional es apropiado para usted.

