

Conozca sus Opciones de Tratamiento para COVID-19

Ahora hay más opciones disponibles para el tratamiento de COVID-19. Mientras que la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, los tratamientos pueden prevenir la hospitalización y la muerte de las personas con mayor riesgo. **Hable con su proveedor de atención médica** sobre las opciones de tratamiento si está en riesgo de una enfermedad grave y está interesado en un tratamiento preventivo **O** si está en riesgo y su resultado de la prueba de COVID-19 es positivo.

Los tratamientos no sustituyen a la vacunación. La vacunación sigue siendo la forma más segura y eficaz de protegerse contra el COVID-19. **Los tratamientos deben comenzar temprano, así que no demore en hacerse la prueba.** Aquí hay información sobre 6 tratamientos disponibles para COVID-19.

	Evusheld	Paxlovid	Molnupiravir	Bebtelovimab	Remdesivir
¿Quién es elegible?	<ul style="list-style-type: none"> 12 años y mayores Personas sin infección de COVID o exposición reciente Y <ul style="list-style-type: none"> un sistema inmunológico debilitado, y ha recibido un tratamiento que reduce el sistema inmunitario O no puede vacunarse debido a una reacción alérgica grave 	<ul style="list-style-type: none"> 12 años y mayores Personas con COVID Y <ul style="list-style-type: none"> un sistema inmunológico debilitado O con mayor riesgo de enfermedad grave 	<ul style="list-style-type: none"> 18 años y mayores Personas con COVID con mayor riesgo de enfermedad grave 	<ul style="list-style-type: none"> 12 años y mayores Personas con COVID Y <ul style="list-style-type: none"> un sistema inmunológico debilitado O con mayor riesgo de enfermedad grave 	<ul style="list-style-type: none"> Adultos y niños que pesan más de 3.5 kg (8 libras) Pacientes aun no hospitalizados con COVID-19
¿Cuándo se debe iniciar?	Antes de la infección para ayudar a prevenir contraer COVID	Dentro de los 5 días desde el inicio de los síntomas	Dentro de los 5 días desde el inicio de los síntomas	Dentro de los 7 días desde el inicio de los síntomas	Dentro de los 7 días desde el inicio de los síntomas
Como se administra?	Inyección	Pastillas tomadas durante 5 días	Pastillas tomadas durante 5 días	Una sola vez de Infusión intravenosa (IV)	Una vez al día durante 3 días de Infusión intravenosa (IV)
¿Donde puede ser dado?	Sitio de cuidado de salud	En Casa	En Casa	Sitio de infusión médica	Sitio de infusión médica